



Name	Frühlings-Fingerkraut
Lateinisch	Potentilla verna
Blühzeit:	Mai bis Juni
Höhe:	5-10 cm
Standort:	Sonnig bis Halbschattig, Gehölzrand oder Freifläche. Geringer Nährstoffbedarf. Auch in Trockenbeeten geeignet. Pflegeleicht. Kein Schneckenfrass.
Besonderes:	Ausdauernd, teppichartig. Z.B. kombinieren Pflanzabstand: 20 - 25 cm



Name	Gewöhnliche Küchenschelle
Lateinisch	Pulsatilla vulgaris
Blühzeit:	März bis April /Frühblüher
Höhe:	bis 20 cm
Standort:	Sonnig, trockener, steiniger Boden, kalkhaltig. Ideal auch für Steingärten, Dachgärten oder Kübel. Kein Schneckenfrass.
Besonderes:	Auch verblüht eine interessante Pflanze. Pflanzabstand: 25-30 cm



Name	Bisam Malve / Moschus-Malve
Lateinisch	Malva moschata
Blühzeit:	Juni - Oktober
Höhe:	50 – 60 cm
Standort:	Sonnig, wärmeliebend, an Wegränder, Schuttplätzen, trocken bis frischer, durchlässiger Boden, humusreich.
Besonderes:	Heilpflanze, essbar. Pflanzabstand: 60 cm



Name	Wiesen Flockenblume
Lateinisch	Centaurea jacea
Blühzeit:	Juni - Oktober
Höhe:	80 - 100 cm
Standort:	Sonnig, Boden sandig/lehmig, mässig nährstoffreich, eher humusarm, anspruchsarm.
Besonderes:	Mehrkjährige, ausdauernde Pflanze. Pflanzabstand: 30-40 cm



Name	Tauben-Skabiose
Lateinisch	Scabiosa columbaria
Blühzeit:	Juli - September
Höhe:	20 – 70 cm
Standort:	Magerwiesen, trockene Hügel
Besonderes:	Mehrjährig, meist verzweigt und mehrköpfig. Frische Blätter für Salat geeignet. Heilkraut. Pflanzabstand: 30 cm



Name	Acker-Glockenblume
Lateinisch	Campanula rapunculoides
Blühzeit:	Juni - September
Höhe:	30 – 70 cm
Standort:	Gebüsche, Wegränder, Schuttplätze in warmen, sonnige Lagen, lehmig, sandiger Boden.
Besonderes:	Pfl. breitet sich gut aus, wenn es ihr gefällt. Pflanzabstand: 30 cm



Name	Gelber Wau
Lateinisch	Reseda lutea
Blühzeit:	Juni - September
Höhe:	25 - 60 cm
Standort:	Wegränder, Bahnareale, Schuttplätze. Nährstoffreiche, lockere, steinige od. lehmhaltige Böden.
Besonderes:	Ursprünglich mediterran. Essbare Pflanze. Pflanzabstand: 50 – 100 cm



Name	Gemeine Natternkopf
Lateinisch	Echium vulgare
Blühzeit:	Mai - Oktober
Höhe:	40 – 100 cm
Standort:	Kiesgruben, Wegränder, Schuttplätze, verträgt Trockenheit, nährstoff- u. humsarm.
Besonderes:	Hat eine Pfahlwurzel. Soll in tiefes Pflanzloch gesetzt werden. Pflanzabstand: 40 – 60 cm



Name	Berg-Aster
Lateinisch	Aster amellus
Blühzeit:	August - September
Höhe:	20 – 60 cm
Standort:	durchlässiger, leicht trockener, fruchtbarer, lehmig-sandiger und steinreicher Boden. Sonnige Lage.
Besonderes:	Aufrechter, horstartiger, kräftiger Wuchs. Absolut frosthart. Pflanzabstand: 40 cm



Name	Blut-Weiderich
Lateinisch	Lythrum salicaria
Blühzeit:	Juli - August
Höhe:	30 - 120 cm
Standort:	Feuchte Wiesen, Flachmoore, Gräben / kollin-montan / CH
Besonderes:	Sehr beliebt bei Wildbienen, Schmetterlingen und Käfern



Name	Gefleckte Taubnessel
Lateinisch	Lamium maculatum
Blühzeit:	April - September
Höhe:	20 - 50 cm
Standort:	Hecken, Wegränder, Schuttplätze
Besonderes:	Winterhart, breitet sich sowohl vegetativ über Ausläufer als auch durch Samen aus, wertvolle Nahrungsquelle für Hummeln, Wildbienen und Schmetterlinge



Name	Feld-Thymian
Lateinisch	Thymus pulegioides
Blühzeit:	April - August
Höhe:	8 - 25 cm
Standort:	Magere Wiesen und Weiden
Besonderes:	Blätter können frisch oder getrocknet als Küchenkraut verwendet werden.